

У женщин через пару лет после начала питания пропорционально выпитому пиву растет вероятность заболевания раком молочной железы. Опасно пить пиво матери, вскармливающей грудного ребенка. У малыша растет вероятность возникновения эпилептических судорог.

В больших количествах пиво оказывается ядом для клеток, поэтому злоупотребление им имеет тяжелые последствия: миокардиодистрофия, цирроз печени, гепатит.

При пивной алкоголизации тяжелее, чем при водочной, поражаются клетки головного мозга, поэтому быстрее нарушается интеллект, обнаруживаются тяжелые изменения психики.

Бороться с влечением к пиву сложнее, чем с влечением к водке. Это влечение очень назойливо и с трудом отпускает. В итоге пивной алкоголизм - очень тяжелая болезнь, трудно поддающаяся лечению.


Принципы лечения

Эффект значительно выше лишь у тех, кто активно хочет излечиться и имеет глубокую мотивацию. Именно поэтому принудительное лечение алкогольной зависимости было признано не целесообразным и в настоящее время не практикуется. Главное - устранение психической и физической зависимостей от алкоголя. Дезинтоксикация (уменьшение явлений отравления) и терапия при соматических



осложнениях являются хотя и важными, но дополнительными мерами и сами по себе алкоголизма не излечивают. Устранение физической зависимости осуществляется довольно эффективно в процессе купирования абстинентного синдрома. Подавление патологического влечения к алкоголю, лежащего в основе психической зависимости, представляет гораздо более трудную задачу. Рациональная психотерапия может проводиться как индивидуально с каждым пациентом, так и в группе. Наилучший эффект дает комплексное лечение, сочетающее в себе и биохимические механизмы, и психологические, и рефлекторные.

Алкоголь ослабляет и колеблет волю человека, лишая его способности длительное время сохранять волевые усилия, проводить решения в действия. Против воли выступает влечение - болезненное стремление к употреблению алкоголя. Если человек решил прекратить употребление алкоголя, ему надо помогать всеми доступными способами.



АЛКОГОЛИЗМ

Что необходимо знать об алкоголизме

По данным медицинской статистики официально диагноз «алкоголизм» поставлен 2,4 млн россиян. Россия становится мировым лидером по уровню потребления алкоголя – 14 литров чистого алкоголя на одного человека в год, при среднестатистическом показателе 9,8 литров.

Проблема хронического алкоголизма остается одной из самых актуальных медико-социальных проблем в России. На счету этого страшного заболевания тысячи распавшихся семей и искалеченных судеб. Причины пьянства разнообразны: трудности приспособления к условиям среды, конфликт с окружением, неудовлетворенность, одиночество, непонятность, утомление, робость, осознание своей неполноценности и другие обстоятельства, вызывающие чувство психологического дискомфорта, временно облегчаемое действием спиртного.

Проблемы, как результат чрезмерного употребления спиртных напитков

* Алкоголизация способствует возникновению конфликтов в семье, которые,

тягостно отражаются на их настроении, взаимоотношениях, а нередко и на здоровье.



* При алкоголизме чаще развиваются сексуальные расстройства.

* Алкогольная деградация, как результат алкоголизма.

* Алкогольный делирий, или белая горячка является острым нарушением психики развивающимся, как правило, спустя 3-4 дня после прекращения алкоголизации.

* Хроническая алкоголизация существенно повышает смертность связанную с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, печени, желудочно-кишечного тракта, бытовым и производственным травматизмом. Общая смертность больных алкоголизмом в 2 раза выше, чем у лиц незлоупотребляющих алкоголем, причем 18% из них – внезапная смерть.

* В последние годы появляются сообщения о патогенной роли этанола в развитии онкологических заболеваний. В опытах на животных доказано, что этанол препятствует естественному разрушению попадающих в организм канцерогенных веществ.

* Особую роль играет хроническая

алкогольная интоксикация в качестве причины самоубийства. Риск самоубийства у больных алкоголизмом в 200 раз выше, чем среди населения в целом.

* Злоупотребление алкоголем, приводящее к развитию алкогольной зависимости, часто сочетается с нарушениями в эмоциональной сфере: от сниженного и часто меняющегося настроения до клинически значимых депрессий.

Медицинские факторы пивного алкоголизма

Пиво быстро всасывается в организм, переполняя кровеносное русло. При большом количестве выпитого возникает варикозное расширение вен и расширение границ сердца. Если злоупотреблять пивом, то сердце «провисает», становится дряблым, а его функция «живого мотора» теряется безвозвратно, т.е. развивается «пивное сердце».

В ответ на прием пива в мужском организме начинает выделяться (в частности, в печени) патологическое вещество, которое подавляет выработку основного мужского полового гормона метилтестостерона. В результате начинают вырабатываться женские половые гормоны: становится шире таз, разрастаются грудные железы.

